

にほん ていきよぼうせつしゅ れい  
日本の定期予防接種のスケジュールの一例

しゅるい 種類	のぞ じき 望ましい時期	かいすう 回数	かんかく 間隔
ポリオ えきたい の (液体を飲みます)	せいご かげつ さい かげつ 生後3ヶ月～1歳6ヶ月ごろ	かい 2回	4～6 週
DPT D:ジフテリア P:百日咳 T:破傷風	き せいご かげつ さい かげつ 1期:生後3ヶ月～2歳6ヶ月ごろ  き 2期(DTのみ):11歳	かい 4回  かい 1回	3～8 週 あけて3回  かいめ なんご 4回目は1年後
ましん ふうしん 麻疹・風疹 (MR)	き さい さい 1期:1歳～2歳  き さい さいみまん しょうがっこうしゅうがくまえ 1ねんかん 2期:5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	かい 2回	
BCG	せいご かげつ かげつ 生後3ヶ月～6ヶ月	かい 1回	

日本定期予防接種の時間安排一例

種類	最理想的の接種時期	次数	間隔
小儿麻痺 (口服疫苗)	出生后3个月～1岁6个月左右	2次	4～6周
DPT (三种混合疫苗) D:白喉 P:百日咳 T:破伤风	第一期:出生后3个月～两岁6个月左右  第二期(仅打白喉和破伤风):11岁	4次  1次	每隔3～8周共3次  第4次在一年后
麻疹・风疹 (MR)	第一期:1岁～两岁  第二期:5岁～7岁之前,即上小学的前一年	2次	
BCG	出生后3个月～6个月	1次	