

にほん ていきよぼうせつしゅ れい
日本の定期予防接種のスケジュールの一例

種類	望ましい時期	回数	間隔
ポリオ (液体を飲みます)	生後3ヶ月～1歳6ヶ月ごろ	2回	4～6週
DPT D:ジフテリア P:百日咳 T:破傷風	1期: 生後3ヶ月～2歳6ヶ月ごろ 2期(DTのみ): 11歳	4回 1回	3～8週あけて3回 4回目は1年後
麻疹・風疹 (MR)	1期: 1歳～2歳 2期: 5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	2回	
BCG	生後3ヶ月～6ヶ月	1回	

Exemple d'agenda pour vaccins périodiques au Japon

Type de vaccination	Période recommandé	Fois	Intervalle
Poliomyélite (liquide à boire)	Entre 3 et 18 mois	2 fois	4-6 semaines
DTP (diphtérie tétanos poliomyélite)	entre 3 mois et 2 ans et demi un rappel : 11 ans	4 fois 1 fois	Trois fois avec l'intervalle de 3-8 semaines et 4eme fois un an d'après
Rougeole/rubéole	1er: entre 1 et 2 ans 2eme : entre 5 et 7 ans (avant l'entrée à l'école primaire)	2 fois	
BCG	Entre 3 et 18 mois	1 fois	