

しゅるい 種類	のぞ じき 望ましい時期	かいすう 回数	かんかく 間隔
ポリオ えきたい の (液体を飲みます)	せいご かげつ さい かげつ 生後3ヶ月～1歳6ヶ月ごろ	かい 2回	4～6 週
DPT D:ジフテリア P:百日咳 T:破傷風	き せいご かげつ さい かげつ 1期:生後3ヶ月～2歳6ヶ月ごろ き 2期(DTのみ):11歳	かい 4回 かい 1回	3～8 週 あけて3回 かいめ なんご 4回目は1年後
ましん ふうしん 麻疹・風疹 (MR)	き さい さい 1期:1歳～2歳 き さい さいみまん しょうがっこうしゅうがくまえ 1ねんかん 2期:5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	かい 2回	
BCG	せいご かげつ かげつ 生後3ヶ月～6ヶ月	かい 1回	

Beispiel eines Japanischen Impfterminplans

Sorte	Erwuenschte Zeit	Anzahl	Zeitabstand
Polio (Fluessigkeit wird eingenommen)	3Monate nach der Geburt- 1Jahr 6Monate	2-Mal	4～6Wochen
DPT D: Diphtherie P: Pertussis T: Tetanus	1.Teil : 3Monate nach der Geburt ~ ca. 2Jahre6Monate 2.Teil (fuer DT): 11. Lebensjahr	4-Mal 1-Mal	3Mal mit 3 ~ 8Wochen Zeitabstand Das 4.Mal nach einem Jahr
Masern, Roeteln (MR)	1.Teil: 1Jahr-2Jahre 2.Teil: 5Jahre-unterhalb 7Jahre, 1Jahr vor der Einschulung	2-Mal	
BCG	3-6 Monate nach der Geburt	1-Mal	