

にほん ていきよぼうせつしゅ れい
日本の定期予防接種のスケジュールの一例

しゅるい 種類	のぞ じき 望ましい時期	かいすう 回数	かんかく 間隔
ポリオ えきたい の (液体を飲みます)	せいご かげつ さい かげつ 生後3ヶ月～1歳6ヶ月ごろ	かい 2回	4～6 週
DPT D : ジフテリア P : 百日咳 T : 破傷風	き せいご かげつ さい かげつ 1期 : 生後3ヶ月～2歳6ヶ月ごろ き 2期 (DTのみ) : 11歳	かい 4回 かい 1回	3～8 週 あけて3回 かいめ なんご 4回目は1年後
ましん ふうしん 麻疹・風疹 (MR)	き さい さい 1期 : 1歳～2歳 き さい さいみまん しょうがっこうしゅうがくまえ 1ねんかん 2期 : 5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	かい 2回	
BCG	せいご かげつ かげつ 生後3ヶ月～6ヶ月	かい 1回	

일본의 정기접종 스케줄의 예

종류	적당한 시기	회수	간격
소아마비 (액체를 마십니다)	생후 3 개월 ~ 1 살 6 개월 경	2 회	4 ~ 6 주
DPT D : 디프테리아 P : 백일해 T : 파상풍	1 기 : 생후 3 개월 ~ 2 살 6 개월 경 2 기 (DT 만) : 11 살	4 회 1 회	3 ~ 8 주 간격으로 3 회 4 회째는 1 년 후
홍역, 풍진 (MR)	1 기 : 1 살 ~ 2 살 2 기 : 5 살 ~ 7 살 미만으로 초등학교 입학하기 전의 1 년간	2 회	
BCG	생후 3 개월 ~ 6 개월	1 회	