

しゅるい 種類	のぞ じき 望ましい時期	かいすう 回数	かんかく 間隔
ポリオ えきたい の (液体を飲みます)	せいご かげつ さい かげつ 生後3ヶ月～1歳6ヶ月ごろ	かい 2回	4～6 週
DPT D：ジフテリア P：百日咳 T：破傷風	き せいご かげつ さい かげつ 1期：生後3ヶ月～2歳6ヶ月ごろ  き 2期(DTのみ)：11歳	かい 4回  かい 1回	3～8 週 あけて3回  4回目は1年後
ましん ふうしん 麻疹・風疹 (MR)	き さい さい 1期：1歳～2歳  き さい さいみまん しょうがっこうしゅうがくまえ 1ねんかん 2期：5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	かい 2回	
BCG	せいご かげつ かげつ 生後3ヶ月～6ヶ月	かい 1回	

Exemplo de um esquema de Vacinas Determinadas

Tipo	Época adequada	Nº de aplicações	Intervalo
Pólio (Via oral)	Por volta de 3 meses a 1 ano e 6 meses	2 vezes	de 4 a 6 semanas
DTP D = difteria P = coqueluche T = tétano	1ª dose: por volta de 3 meses a 2 anos e 6 meses 2ª dose: (apenas DT): 11 anos	4 vezes 1 vez	3 doses deixando intervalo de 3 a 8 semanas 4ª dose após a ano
Sarampo e Rubéola (MR)	1ª dose: de 1 a 2 anos 2ª dose: de 5 anos até completar 7 anos (no período de 1 ano antes do ingresso ao primário)	2 vezes	
BCG	De 3 a 6 meses	1 vez	