

にほん ていきよほうせつしゅ れい
日本の定期予防接種のスケジュールの一例

しゅるい 種類	のぞ じき 望ましい時期	かいすう 回数	かんかく 間隔
ポリオ えきたい の (液体を飲みます)	せいご かげつ さい かげつ 生後3ヶ月～1歳6ヶ月ごろ	かい 2回	4～6 週
DPT D:ジフテリア P:百日咳 T:破傷風	き せいご かげつ さい かげつ 1期:生後3ヶ月～2歳6ヶ月ごろ き 2期(DTのみ): 11歳	かい 4回 かい 1回	3～8 週 あけて3回 かいめ なんご 4回目は1年後
ましん ふうしん 麻疹・風疹 (MR)	き さい さい 1期: 1歳～2歳 き さい さいみまん しょうがっこうしゅうがくまえ 1ねんかん 2期: 5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	かい 2回	
BCG	せいご かげつ かげつ 生後3ヶ月～6ヶ月	かい 1回	

Ang halimbawa ng talatakdaan ng pang-peryodikon pagpabakuna sa Japan

Pangalan ng Bakuna	Panahon	Ilan Beses	Pagitan ng Pagpabakuna
Oral Polio (Pinapainom na syrup)	Pagkapanganak ng ika-3 buwan hanggan 1 taon gulang at 6 na buwan	2 beses	Ika-4 hanggan 6 na linggo
DPT D: Diphtheria (Pagtatae) P: Pertusis (WhoopingCough) T: Tetanus Tetano	1 Stage: Pagkapanganak ng ika-3 buwan hanggan 2 taon gulang at 6 na buwan 2 Stage (DT lang): 11 taon gulang	4 na beses 1 beses	Sa pagitan ng ika-3 linggo hanggan 8 linggo; 3 beses pagkatapos ng pang-apat; pagka-isang taon
MR Measles (Tigdas) Rubella/German Measles	1 Stage: Pagka-isang taon gulang hanggan 2 taon gulang 2 Stage: 5 taon gulang hanggan bago mag-7 taon; isang taon bago pumasok sa elementarya	2 beses	
BCG	Pagkapanganak ng ika-3 buwan hanggan ika-6 na buwan	1 beses	