

しゅるい 種類	のぞ じ き 望ましい時期	かいすう 回数	かんかく 間隔
ポリオ えきたい の (液体を飲みます)	せいご かげつ さい かげつ 生後3ヶ月～1歳6ヶ月ごろ	かい 2回	4～6 週間
DPT D : ジフテリア P : 百日咳 T : 破傷風	き せいご かげつ さい かげつ 1期 : 生後3ヶ月～2歳6ヶ月ごろ  き (DTのみ) : 11 歳	かい 4回  かい 1回	3～8 週間 あけて3回  4回目は1年後
ましん ふうしん 麻疹・風疹 (MR)	き さい さい 1期 : 1歳～2歳  き さい さい みまん しょうがっこうしゅうがくまえ 1ねんかん 2期 : 5歳～7歳未満で小学校就学前の1年間	かい 2回	
BCG	せいご かげつ かげつ 生後3ヶ月～6ヶ月	かい 1回	

## ตัวอย่างของตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคของญี่ปุ่น

ชนิด	ช่วงเวลาที่ต้องการฉีดวัคซีน	จำนวนครั้ง	ระยะห่าง
โปลิโอ (เป็นยาน้ำ)	หลังคลอด3เดือนถึง1ปี6เดือน	สองครั้ง	4-6สัปดาห์
DPT D คอตีบ P ไอกรน T บาดทะยัก	งวดแรก 3ถึง 2ปี6เดือน  งวดที่สอง (เฉพาะDT) : 11 ปี	สี่ครั้ง  หนึ่งครั้ง	เว้นระยะ 3-8 สัปดาห์ สามครั้ง ครั้งที่ 4หลังจากนั้น 1ปี
หัด*หัดเยอรมัน (MR)	งวดแรก : 1ปีถึง 2ปี  งวดที่สอง : 5 ปีถึง7ปีก่อนเข้าโรงเรียนชั้นประถมหนึ่งปี	สองครั้ง	
บีซีจี BCG	หลังคลอด3เดือน1ปี6เดือน	หนึ่งครั้ง	

